

Nematoden und Ihre Einsatzgebiete



Schädling	Adult	Larve	Schadbild	Larven	Nützlinge	Bekämpfungszeit
Dickmaulrüssler-Larve 12 Monate				8-10 mm lang, schmutzig-weiß, braune Kopfkapsel, C-förmig gekrümmt		J F M A M J J A S O N D Im Innenraum und unter Glas ganzjährig
Dickmaulrüssler-Käfer 12 Monate				8-10 mm lang, schmutzig-weiß, braune Kopfkapsel, C-förmig gekrümmt		J F M A M J J A S O N D
Gartenlaubkäfer 12 Monate				Larve < 20 mm, Engerlinge unter Rasennarbe, Analspalt ähnelt grinsendem Mund		J F M A M J J A S O N D Sechs Wochen nach Käferflug Lockstoff-Fallen im Mai/Juni aufstellen
Junikäfer 24 Monate				Larve > 20 mm, Analspalt hat Form eines »Ypsilon«, »Mercedesstern« siehe Abbildung		J F M A M J J A S O N D Nur gegen 1. Larvenstadium
Maulwurfsgrille Werre 14 Monate		Adults verursachen den Schaden	zerwühlte Saatbeete, angefressene Wurzeln und Knollen vor allem bei Gemüse, Kartoffeln und Rasen	weiße, ameisenähnliche Larven; bekämpft werden aber die adulten Tiere		J F M A M J J A S O N D Im Folgejahr wiederholen
Feldmaikäfer 3-5 Jahre				Larve > 20 mm, bauchseitig lange, parallele Borstenreihe, »Dreitagebart«, Analspalt als Strich		J F M A M J J A S O N D
Purzelkäfer 24 Monate				Larve < 20 mm, »Pelz« auf dem Rücken		J F M A M J J A S O N D
Haarmücke 12 Monate			vergilbte Befallsnester im Rasen, im März/April mit bis zu 300 Larven	Larve < 15 mm, beinlos, wurmartig, graubraun		J F M A M J J A S O N D
Dungkäfer 12 Monate			Schäden an Rasen schon im zeitigen Frühjahr, da während des ganzen Winters aktiv	Larve < 15 mm, unspezifischer Analspalt		J F M A M J J A S O N D
Erdraupen 6 Monate				grau-grünlich gefärbt, 3-5 cm lang, glatte Haut ohne Haare, 3 Beinpaare		J F M A M J J A S O N D
Trauermücke 21 Tage				glasig, weiße Larve, max. 5 mm lang, schwarze Kopfkapsel, bevorzugt in humoser Erde		J F M A M J J A S O N D
Asseln 1-2 Jahre		Adults verursachen den Schaden				J F M A M J J A S O N D
Wiesenschnake 12 Monate			nesterweise Kahlstellen im Rasen, im März/April Schäden durch pickende Vögel	graue, beinlose, tönnchenförmige Larve, zusammengezogen 1 cm, gestreckt bis 4 cm; Teufelsfratze am Anus		J F M A M J J A S O N D
Apfelwickler 6 Monate				20-30 mm lang, weiß, später rötlicher, mit schwarzer Kopfkapsel		J F M A M J J A S O N D